

Употреба

Novalac Aminova е диетична храна за специални медицински цели. Novalac Aminova е концентрирана храна, която съдържа само свободни аминокиселини и следователно е хипоалергенна. Не съдържа протеини от краве мляко. Подходящ е за кърмачета и малки деца с тежка алергия към протеини от краве мляко и / или за алергии към различни видове храни, свързани или несвързани с непоносимост към напълно хидролизирани формули. Не въвеждайте други млечни ястия (бебешки зърнени храни, мляко, млечни продукти) в диетата на детето си, без предварително да се консултирате с лекар. Може да се използва като единствената диета до 6-месечна възраст, а след 6-месечна възраст Novalac Aminova може да се използва като част от разнообразна диета по съвет на лекар. Novalac Aminova не съдържа лактоза и глютен. Novalac Aminova не е подходящ за хранене през сонда.

Важна информация

Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачета. Използвайте Novalac Aminova само под лекарско наблюдение. Не използвайте продукта като единствен източник на храна след 6-месечна възраст. Не го използвайте за хранене на здрави бебета. Novalac Aminova не трябва да се използва в случай на галактоземия или глюкозна и/или галактозна малабсорбция. Специални грижи са необходими и при кърмачета с отслабен имунен отговор, недоносени бебета или бебета с ниско тегло при раждане. При хранене от шише, уверете се, че контактът между млякото на бебето и зъбите не е твърде дълъг или чест, тъй като това увеличава шанса за кариес. Винаги мийте зъбите на бебето след нощното хранене. Неправилното приготвяне или съхранение може да представлява риск за здравето. Novalac Aminova не е подходящ за парентерална употреба.

Дозировка

Възраст на кърмачето (месеци)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Брой хранения на ден	6	5	5	4	3*	2*-3*
Брой лъжички за приготвяне на едно хранене	3	4	5	7	7	8
Количество вода (ml)	90	120	150	210	210	240

* като част от разнообразното хранене

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 5 g Novalac Aminova. Разтворете една лъжичка в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен ако лекарят не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

- Винаги пригответе храната непосредствено преди хранене.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина.
- Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатаната на дъното на металната кутия.
- След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици. Затваряйте кутията плътно след употреба.
- Не съхранявайте остатъци от храна. Изхвърлете остатъците. Опаковано при контролирани атмосферни условия.


Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария • Държава на произход: Германия • Официален представител за България: Медис Фарма България ЕООД, София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширков“ 31



Novalac Aminova

Храна за специални медицински цели -
с добавени свободни аминокиселини

За диетотерапия при тежка
алергия към протеини от краве
мляко и / или за алергии към
различни видове храни



0-36 месеца

400 g e

Хранителна стойност

	100 g	100 ml
Енергийна стойност		
	kJ	2040
	kcal	487
Мазнини	g	22,1
От които		
- наситени	g	10
- Линолова киселина	g	3,5
- α-линоленова киселина	mg	340
- DHA (докозахексаенова киселина)	mg	120
- ARA (арахидонова киселина)	mg	120
Въглехидрати	g	57,9
От които		
- захари	g	4,9
Диетични фибри	g	1,9
Протеин	g	12,5
Сол	g	0,55
Витамини		
Витамин А	µg RE	440
Витамин D3	µg	12
Витамин Е	mg	8,7
Витамин К1	µg	30
Витамин С	mg	60
Витамин В1 (Тиамин)	µg	800
Витамин В2 (Рибофлавин)	µg	1200
Ниацин	mg	4,5
Витамин В6	µg	600
Фолиева киселина	µg	80
Фолат	µg DFE	135
Витамин В12	µg	1,5
Биотин	µg	15
Пантотенова киселина	mg	5
Минерали		
Натрий	mg	220
Калий	mg	655
Хлорид	mg	400
Калций	mg	500
Фосфор	mg	345
Магнезий	mg	45
Желязо	mg	7,8
Цинк	mg	3,5
Мед	µg	380
Манган	µg	65
Флуорид	µg	<340
Селен	µg	22
Хром	µg	<45
Молибден	µg	<45
Иод	µg	95
Холин	mg	170
Инозитол	mg	80
Таурин	mg	40
L-карнитин	mg	20

Съставки

Малтодекстрини, растителни мазнини (палмово, рапично, слънчогледово, кокосово), състител (пектин, кантанова гума), емулгатор (естери на моно- и диглицериди на лимонената киселина), L-глутамин, L-лизин-L-аспартат, калиеви соли на ортофосфорната киселина, L-левцин, L-пролин, нишесте от тапиока, калиев хлорид, калиеви соли на лимонената киселина, L-валин, L-изолевцин, L-треонин, L-аргинин-L-аспартат, L-серин, L-аланин, L-тирозин, L-фенилаланин, холин бигаратат, L-хистидин, натриеви соли на ортофосфорната киселина, глюкоза, магнезиеви соли на лимонената киселина, масло от Mortierella alpina (ARA), L-триптофан, масло от водорасли Schizochytrium sp. (DHA), L-цистин, L-метионин, L-аргинин, калиев хидроксид, витамини (L-аскорбинова киселина, DL-α-токоферол ацетат, калиев D-пантотенат, ниацин, рибофлавин, тиамин хидрохлорид, пиридоксин хидрохлорид, ретинол ацетат, фолиева киселина, фитоменадон, D-биотин, холекалциферол, цианокобаламин), железен дифосфат, инозитол, таурин, L-карнитин, цинков сулфат, натриев селенит, антиоксиданти (екстракт, богат на токоферол; аскорбил палмитат), меден сулфат, калиев йодид, манганов сулфат.

Инструкции за приготвяне

МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕНО.



1 Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с бибера на във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 10 минути.



2 Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



3 Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето.



4 С приложената в кутията мерителна лъжичка сложете препоръчания брой лъжички от млякото за кърмачета в шишето.



5 Затворете шишето и го разклатете добре, така че прахообразната съставка да се разтвори изцяло.



6 Охладете пригответената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.